

ESQUEMAS VACINAIS COVID-10, CONTAGEM.

ATUALIZAÇÃO 17/11/2022

| CRIANÇAS DE 6 MESES A 2 ANOS 11 MESES E 29 DIAS | | | | |
|---|----------|----------------------|----------------------|----------------|
| Vacina contra a COVID-19 | D1 | D2 | D3 | Volume da dose |
| Comirnaty/Pfizer Pediátrica – tampa vinho | UTILIZAR | 4 semanas após D1 | 8 semanas após D2 | 0,2 ml |

| CRIANÇAS DE 3 e 4 ANOS | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Vacina contra a COVID-19 | D1 | D2 | Volume da dose |
| Coronavac/Butantan | UTILIZAR | 4 semanas após D1 | 0,5 ml |

| CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS | | | |
|---|----------|-------------------|----------------|
| Vacina contra a COVID-19 | D1 | D2 | Volume da dose |
| Comirnaty/Pfizer Pediátrica – tampa laranja | UTILIZAR | 8 semanas após D1 | 0,2 ml |

| ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Vacina contra a COVID-19 | D1 | D2 | D3 | Volume da dose |
| Coronovac/Butantan | NÃO UTILIZAR | 4 semanas após D1 | 4 meses após a D2, com a Pfizer. | 0,5 ml |
| Comirnaty/Pfizer | UTILIZAR | 3 semanas após D1 | 4 meses após a D2. | 0,3 ml |

| ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDAS, INCLUINDO GESTANTES OU PUÉRPERAS IMUNOCOMPROMETIDAS | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Vacina contra a COVID-19 | D1 | D2 | Dose Adicional (DA) | | Reforço (REF) | |
| | | | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 |
| Comirnaty/ Pfizer | UTILIZAR | 3 semanas após D1 | 8 semanas após D2 | Comirnaty/ Pfizer | A partir de 4 meses após dose adicional ou DA. | Comirnaty/ Pfizer |

| ACIMA DE 18 ANOS | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Vacina contra a COVID-19 | D1 | D2 | Reforço (REF) | | Segundo Reforço (R2) | | Terceiro Reforço (R3) | |
| | | | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 |
| Coronavac/Butantan | NÃO UTILIZAR. | 4 semanas após D1 | 4 meses após D2 | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após REF | Astrazeneca ou Janssen. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| AstraZeneca | NÃO UTILIZAR. | 8 semanas após D1 | 4 meses após a D2 | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após REF | Astrazeneca ou Janssen. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| Comirnaty/ Pfizer | NÃO UTILIZAR. | 3 semanas após D1 | 4 meses após a D2 | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após REF | Astrazeneca ou Janssen. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| Janssen | UTILIZAR. | Não se aplica. | 2 meses após D | JANSSEN | 4 meses após REF | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após segundo reforço | Astrazeneca ou Janssen. |

| ACIMA DE 18 ANOS GESTANTES OU PUÉRPERAS | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Vacina contra a COVID-19 | D1 | D2 | Reforço (REF) | | Segundo Reforço (R2) | |
| | | | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 |
| Coronovac/ Butantan | NÃO UTILIZAR. | 4 semanas após D1 | 4 meses após D2 | Comirnaty/ Pfizer | 4 meses após REF | Comirnaty/ Pfizer |
| Comirnaty/ Pfizer | UTILIZAR | 3 semanas após D1 | 4 meses após a D2 | Comirnaty/ Pfizer | 4 meses após REF | Comirnaty/ Pfizer |

ACIMA DE 18 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDO, NÃO GESTANTE OU PUÉRPERA

| Vacina contra a COVID-19 | D1 | D2 | Dose Adicional (DA) | | Reforço (REF) | | Segundo Reforço (R2) | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 |
| Coronavac Butantan | NÃO UTILIZAR. | 4 semanas após D1 | À partir de 8 semanas após D2 | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após dose adicional ou DA. | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após dose de reforço. | Astrazeneca ou Janssen. |
| AstraZeneca | NÃO UTILIZAR. | 8 semanas após D1 | À partir de 8 semanas após D2 | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após dose adicional ou DA. | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após dose de reforço. | Astrazeneca ou Janssen. |
| Comirnaty/ Pfizer | NÃO UTILIZAR. | 3 semanas após D1. | À partir de 8 semanas após D2 | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após dose adicional ou DA. | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após dose de reforço | Astrazeneca ou Janssen. |

JANSSEN

| Vacina contra a COVID-19 | Dose única (D) | D2 | Dose Adicional (DA) | | Reforço (REF) | | Segundo Reforço (R2) | | Terceiro Reforço (R3) | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 | Intervalo | Vacina contra COVID-19 |
| Janssen | UTILIZAR | Não recomendada | 2 meses após D. | Janssen | 4 meses após dose adicional (DA). | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após dose de reforço | Astrazeneca ou Janssen. | 4 meses após segundo reforço | Astrazeneca ou Janssen. |