

# ANEXO I

## ESQUEMA VACINAL DE DOSES MONOVALENTES - POR GRUPO ETÁRIO

PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM ASTRAZENECA, CORONAVAC, PFIZER


### VACINAS RECOMENDADAS PARA DOSES DE REFORÇO

**03 anos a 04 anos, 11 meses e 29 dias:** Pfizer, caso não disponível CoronaVac

**05 a 17 anos:** Pfizer, caso não disponível, utilizar CoronaVac

**18 anos a 39 anos:** Preferencialmente Pfizer. Caso não disponível poderá ser realizado com a vacina disponível no momento (AstraZeneca ou Janssen)

**40 anos a 59 anos:** Preferencialmente Pfizer. Caso não disponível poderá ser realizado com a vacina disponível no momento (AstraZeneca ou Janssen)



Intervalo de 8 semanas\*

Intervalo de 4 meses

Intervalo de 4 meses

Intervalo de 4 semanas

Intervalo de 8 semanas

\*Intervalo de 4 semanas para CoronaVac

### OBSERVAÇÕES

**Esquema primário:** definido com **duas** doses monovalentes (1ª DOSE + 2ª DOSE)

**Gestantes:** Pfizer, caso não disponível, utilizar CoronaVac. Não recomendado uso de vacinas de vetor viral.


### OBSERVAÇÕES

**\*\*06 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias**  
**Esquema primário:** definido com **três** doses monovalentes (1ª DOSE + 2ª DOSE + 3ª DOSE) Pfizer (frasco tampa vinho)

**\*\*\*03 anos a 04 anos, 11 meses e 29 dias:**  
**Esquema primário:** definido com **duas** doses monovalentes (1ª DOSE + 2ª DOSE) CoronaVac

# ESQUEMA VACINAL DE DOSES MONOVALENTES - POR GRUPO ETÁRIO

PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM JANSSEN



## OBSERVAÇÕES

**Esquema primário:** definido com **duas** doses monovalentes (1ª DOSE + 2ª DOSE)

## VACINAS RECOMENDADAS PARA DOSES DE REFORÇO

**Gestantes:** Imunizante **NÃO** recomendado para esse grupo

**18 anos a 39 anos:**  
Preferencialmente Pfizer.  
Caso não disponível poderá ser realizado com a vacina disponível no momento (AstraZeneca ou Janssen)

**40 anos a 59 anos:**  
Preferencialmente Pfizer.  
Caso não disponível poderá ser realizado com a vacina disponível no momento (AstraZeneca ou Janssen)